



DLP 12-5-92010828




EDITION GRANDES CULTURES

Bulletin n°217 (09/92) du 05 Mai 1992

MAIS	**: Point sur la sésamie et la pyrale en 1992**
COLZA	**: Terminez les traitements charançons des siliques**

STATION
POITOU-CHARENTES

Publication périodique
Imprimerie de la Station de Poitou-Charentes Directeur Gérant:
J.P. PIQUEMAL
CPPAP n° 1664 AD
ISSN n° 6294 4693
Abonnement annuel : 300 F
Chèque bancaire ou postal à l'ordre du sous régisseur de recettes Avertissements Agricoles



DIRECTION REGIONALE
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
SERVICE REGIONAL
DE LA PROTECTION
DES VEGETAUX
13, ROUTE DE LA FORET 86580
BIARD
TEL: 49 58 39 02
FAX: 49 58 23 82



COLZA

Stade G1 à G3 (chute des premiers pétales à 10 premières siliques ayant une longueur supérieure à 4 cm).

INSECTES

CHARANCONS DES SILIQUES

Situation
Les femelles vont être aptes à pondre en fin de semaine, en Vienne et Deux-Sèvres.

Préconisation
Nous vous confirmons les préconisations du bulletin du 8 Avril. Profitez du beau temps de cette semaine pour finir de réaliser vos traitements.

PUCERONS CENDRES DU CHOU

La situation et les préconisations du bulletin du 28 Avril restent valables.

MALADIES

On n'a pas enregistré de nouvelles périodes favorables aux contaminations du sclérotinia depuis le 2 Avril.

POIS

Stade 8 à 12 feuilles.

PUCERONS

Situation
Ils ne sont pas observés en culture pour le moment.

Préconisation
Il est trop tôt pour intervenir. Nous vous rappelons les seuils d'intervention :
- 30 pucerons/plante début floraison ;
- 50 pucerons/plante pleine floraison ;
- 100 pucerons/plante fin floraison.

MALADIES

Situation
La situation est saine pour le moment. Quelques attaques d'anthracnose sont présentes sur feuilles basses essentiellement sur la variété Messire.

Préconisation
Intervention inutile pour le moment.

BLE

AGROMYZA

Situation
Attaque généralisée et importante sur tout l'Ouest de la région. Plus à l'Est (Vienne, Charente), le vol est beaucoup moins important pour l'instant (de 0 à 20 % d'avant dernières feuilles portant des piqûres nutritionnelles, localement 40 %).

Préconisation

Intervenir sur la façade atlantique lorsque le seuil (bulletin n° 216) est atteint (cas fréquent). Pas de traitement ailleurs sauf en cas de dépassement de ce seuil (cas très rare).

MAIS

SESAMIE

☞ Situation
Les gelées de cet hiver n'ont pas été suffisantes pour détruire les populations de sésamies sur les parcelles ne présentant pas de façons culturales après récolte.


La mortalité de cet insecte se situe cette année aux alentours de 30 à 40 %.

Prévision
La nymphose quant à elle n'a débuté qu'autour du 15 Avril 1992, ce qui nous laisse présager un début de premier vol autour du 20 Mai 1992. Ce vol sera donc tardif et devrait éviter la prise en compte d'une 2ème génération qui arrivera très tard cette année.

La carte ci-jointe fournie les zones à risques pour le vol de première génération.

Les dates d'interventions seront communiquées dans les avertissements agricoles.

Zones à risques pour 1992




PYRALE

☞ Situation
Des sondages effectués en Sud-Charente laissent présager un risque important cette année sur les secteurs à risques (voir carte).

Prévision
Sur certains secteurs à risques, en fonction des conditions climatiques à venir, il sera nécessaire de prendre en compte cet insecte (secteurs identifiés sur la carte ci-dessous).
Les dates d'interventions vous seront communiquées dans les avertissements agricoles.

Zones à risques en 1992



Attention, comme nous l'avons observé en 1990, les parcelles semées tard en 1991, se sont révélées très infestées en pyrales et sésamies. Elles constituent de véritables réservoirs qui peuvent créer localement des foyers d'infestations en dehors des zones à risques.